

Oversigt

Zero 2% larvicid mod fluelarver, 5 kg.

Varenummer: 481065

Pris

Priser er ekskl. moms dertil kommer fragt



Beskrivelse

ZERO® anvendes til bekæmpelse af fluelarver (herunder rottehaelarver) i gødning, strøelse, gødning og gyllebeholdere eller flydende gødning. Det indeholder et vækstforstyrrende middel, der virker specifikt mod alle fluelarver og har ingen virkning på voksne fluer.

ZERO® består af et vandopløseligt granulat: 20 g/kg cyromazin (2 %).

Anvendelsesområde og dosering:

Afhængigt af vandindholdet i det materiale, der skal behandles, er der følgende anvendelsesmuligheder:

- Udbringning af granulatet direkte på overfladen (250 g pr. 10 m²)
- Sprøjtning (250 g til 10 m² i 1 til 4 l vand)
- Vanding (250 g til 10 m² i 4 -10 l vand).

Oprettet den 24.09.2026.

Dette dokument udgør ikke et tilbud. De aktuelle priser i onlinebutikken gælder.

* Alle priser ekskl. Moms plus forsendelsesomkostninger og mulige leveringsomkostninger, hvis ikke andet er angivet.

Gentag behandlingen ca. hver 6. uge, eller så snart det sidst behandlede lag er dækket af ca. 10 cm, eller der observeres en genkomst af fluelarver.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

ZERO® anvendes overalt, hvor fluelarver kan udvikle sig:

- I kvæg-, kalve- og hestestalde behandles ca. 50 cm brede, dybe strøleskantområder langs væggene, ved siden af og under installationer med vandingsdåsen eller med rygsprøjten. Hvis der er tale om flydende gødning, kan ZERO® spredes direkte. Den første behandling bør foretages ca. 1-3 dage efter, at gødningen er fjernet.
- I kvægstalde med spaltegulve skal hele gulvarealet drysses jævnt med ZERO®.
- I svinestalde med fuld spaltegulv skal hele området behandles, i tilfælde af delvis spaltegulv hele spalteområdet samt kantområderne i liggeområderne. Det er tilrådeligt at anvende før opstaldning eller efter fjernelse af gødning eller dræning.
- I hønsestalde med en gødningsgrav skal granulatet spredes tørt, hvis gødningen er fugtig eller flydende; hvis gødningen er tør, skal produktet udbringes med en vandkande eller en tryksprøjte.

Behandl hele gødningsområdet første gang ca. 1 uge efter fjernelse af gødningen, men før et gødningsdækket er 10 cm. tykt. Pose med 5 kg.