Adresse:
Skrænten 11
9610 Nørager
Danmark

Kontakt:
Telefon: +45 60 12 11 44
E-mail: cs@camro.dk
CVR: 26548004

Oversigt

Zero 2% larvicid mod fluelarver, 5 kg.

Varenummer: 481065



Pris

Priser er ekskl. moms dertil kommer fragt

Beskrivelse

ZERO® anvendes til bekæmpelse af fluelarver (herunder rottehalelarver) i gødning, strøelse, gødning og gyllebeholdere eller flydende gødning. Det indeholder et vækstforstyrrende middel, der virker specifikt mod alle fluelarver og har ingen virkning på voksne fluer.

ZERO® består af et vandopløseligt granulat: 20 g/kg cyromazin (2 %).

Anvendelsesområde og dosering:

Afhængigt af vandindholdet i det materiale, der skal behandles, er der følgende anvendelsesmuligheder:

- Udbringning af granulatet direkte på overfladen (250 g pr. 10 m2)
- Sprøjtning (250 g til 10 m2 i 1 til 4 l vand)
- Vanding (250 g til 10 m2 i 4 -10 l vand).

Oprettet den 08.11.2026.
Dette dokument udgør ikke et tilbud. De aktuelle priser i onlinebutikken gælder.
* Alle priser ekskl. Moms plus forsendelsesomkostninger og mulige leveringsomkostninger, hvis ikke andet er angivet.

Adresse:
Skrænten 11
9610 Nørager
Danmark

Kontakt:
Telefon: +45 60 12 11 44
E-mail: cs@camro.dk
CVR: 26548004

Gentag behandlingen ca. hver 6. uge, eller så snart det sidst behandlede lag er dækket af ca. 10 cm, eller der observeres en genkomst af fluelarver.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

ZERO® anvendes overalt, hvor fluelarver kan udvikle sig:

- I kvæg-, kalve- og hestestalde behandles ca. 50 cm brede, dybe strøelseskantområder langs væggene, ved siden af og under installationer med vandingsdåsen eller med rygsprøjten. Hvis der er tale om flydende gødning, kan ZERO® spredes direkte. Den første behandling bør foretages ca. 1-3 dage efter, at gødningen er fjernet.
- I kvægstalde med spaltegulve skal hele gulvarealet drysses jævnt med ZERO®.
- I svinestalde med fuld spaltegulv skal hele området behandles, i tilfælde af delvis spaltegulv hele spalteområdet samt kantområderne i liggeområderne. Det er tilrådeligt at anvende før opstaldning eller efter fjernelse af gødning eller dræning.
- I hønsestalde med en gødningsgrav skal granulatet spredes tørt, hvis gødningen er fugtig eller flydende; hvis gødningen er tør, skal produktet udbringes med en vandkande eller en tryksprøjte.

Behandl hele gødningsområdet første gang ca. 1 uge efter fjernelse af gødningen, men før et gødningsdækket er 10 cm. tykt. Pose med 5 kg.